

FICHA TÉCNICA

RED SCORPION POWER · Activador radicular, del cuaje y la maduración



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO RED SCORPION POWER	BASE Extracto de algas marinas Ulva spp.	ACTIVOS DESTACADOS Magnesio · Alginatos · β -carotenos
--------------------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Activador radicular, del cuaje y la maduración a base de extracto de algas marinas (Ulva spp.). Rico en magnesio, alginatos y β -carotenos. Elaborado a partir de macroalgas cultivadas en esteros del Paraje Natural de las marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, en Cartaya (Huelva), espacio perteneciente a RED NATURA 2000. En la fase de enraizamiento actúa como bioestimulante orgánico. Su proceso de extracción en frío y sus principios activos naturales promueven la germinación, el rápido enraizamiento, el crecimiento de raíces secundarias y una mayor absorción de nutrientes y agua. Favorece la resistencia frente al estrés biótico y abiótico, la actividad endógena, el desarrollo vegetativo y el incremento de producción y calibre.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Estimula la germinación y el crecimiento de raíces, la precocidad y el crecimiento vegetativo.	Beneficia el intercambio entre la raíz y el suelo.
Favorece la recuperación de cultivos sometidos a estrés.	Incrementa la absorción radicular y la translocación de nutrientes.
Mejora el trasplante.	Reduce la absorción de sodio por parte de la planta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.

COMPOSICIÓN

RED SCORPION POWER · Perfil técnico



COMPOSICIÓN DECLARADA

2,20 % p/v Materia orgánica	0,23 % p/v Magnesio (MgO)	1,12 % p/v Ácido algínico	0,65 % p/v Azufre
0,01 % p/v Hierro	0,0025 % p/v Manganeso	2,54 % p/v Zinc	1,667 % p/v Aminoácidos totales
1,234 mg/kg β-carotenos	1,28 % p/v Carbono orgánico total		

SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS

4-hidroxiprolina 0,0266%	Ac. Aspártico + Asparragina 0,208%
Ac. Glutámico + Glutamina 0,134%	Alanina 0,120%
Arginina 0,0584%	Fenilamina 0,0923%
Glicina 0,1687%	Histidina 0,0157%
Isoleucina 0,059%	Leucina 0,1423%
Lisina 0,0623%	Metionina 0,0323%
Prolina 0,1316%	Serina 0,1096%
Tirosina 0,0767%	Treonina 0,0827%
Valina 0,1383%	

PRESENTACIÓN

CATEGORÍA Enraizante	FORMATOS 1 L · 5 L
-------------------------	-----------------------

RECOMENDACIONES DE USO



Dosis orientativas por tipo de cultivo

CULTIVOS	APLICACIONES	VÍA RADICULAR	VÍA FOLIAR
Cítricos, aguacate, olivo, vid y frutales	1-3 aplicaciones, espaciadas 10 días, desde el inicio del ciclo.	4 l/ha	300 cc/100 l
Fresa, frambuesa, arándano, mora y berries	1-2 aplicaciones, espaciadas 10 días, desde el trasplante.	3 l/ha	—
Tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, berenjena, judía y hortalizas	1-2 aplicaciones, espaciadas 10 días, desde el trasplante.	3 l/ha	—
Acelga, lechuga, col, coliflor, apio y hojas	1-2 aplicaciones, espaciadas 10 días, desde el trasplante.	3 l/ha	—
Maíz, arroz y cereales	1-2 aplicaciones, espaciadas 10/20 días, desde la emergencia.	2 l/ha	—
Viveros	Aplicaciones cada 10 días desde la emergencia.	3 l/ha	—
Ornamentales	1 aplicación cada 15/21 días desde la plantación.	3 l/ha; 300 cc/100 l	—

PLAZO DE SEGURIDAD Y LMR

No procede

MODO DE EMPLEO

RED POWER es un activador radicular, del cuaje y la maduración natural a base de macroalgas marinas, que ayuda a activar el crecimiento y enraizamiento de plántulas y esquejes.

MODO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

Indicaciones complementarias · RED SCORPION POWER



APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Favorece el trasplante de todo tipo de plantas. Ayuda a superar procesos de estrés y promueve una adecuada floración, cuajado y maduración del fruto, aumentando el calibre y la producción. Puede aplicarse vía foliar o radicular. Para un uso correcto por vía foliar, se recomienda utilizar agua suficiente para el recubrimiento total del cultivo. Es un excelente vehículo para la aplicación de otros productos a bajas dosificaciones. Si no existe experiencia previa, se recomienda una prueba previa.

CEREALES

No superar 15 l/ha y año.

RESTO DE CULTIVOS

No superar 20 l/ha y año.

CÍTRICOS

Aplicar como muy tarde a finales de junio en variedades de recolección otoñal e invernal.

RECOMENDACIÓN: Varias aplicaciones a dosis bajas dan mejores resultados que una aplicación a dosis excesiva. Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios; en caso de duda, elaborar una mezcla previa antes de su aplicación.

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

✓ No comer, beber ni fumar durante su utilización.

pH
5,6

Conductividad eléctrica
8,29 dS/m

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar energicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. No abandonar el envase; depositarlo en los puntos de recogida adecuados o entregarlo a un gestor autorizado.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.